

# くすりのしおり

内服剤

2017年01月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名: ビタノイリンカプセル 50

**主成分:** フルスルチアミン塩酸塩 (Fursultiamine hydrochloride)  
ピリドキサルリン酸エステル水和物 (Pyridoxal phosphate hydrate)  
ヒドロキソコバラミン酢酸塩 (Hydroxocobalamin acetate)  
リボフラビン (Riboflavin)



**剤形:** 赤紫色、だいたい色、黄色および白色の混合顆粒が充填された頭部・胴部とも無色透明のカプセル剤、長径 19.0mm、短径 6.8mm

**シート記載など:** (表) 330 50、(裏) ビタノイリン 50 50

## この薬の作用と効果について

神経細胞に働きかけ、神経刺激症状を改善するビタミン B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>、B<sub>12</sub> の配合剤です。通常、食事からの摂取が不十分な際のビタミン B 群の補給、神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神経麻痺などに用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は 1 日 1～2 カプセルを服用します。治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時に 1 回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、飲まないでおき、次に飲む時間から飲んでください。2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・本剤に含まれるビタミン B<sub>2</sub> により、尿が黄色くなることもあり、検査に影響を及ぼすことがあるので、臨床検査を受ける場合には、この薬を飲んでいることを医師に必ず伝えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

副作用として、発疹、かゆみ、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、腹部膨満感、口渇、下痢、不眠、頻尿などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。